

이 흐를수록 악화되어 심각한 통증과 더불어 보행 편을 겪게 된다.

초기에는 적절한 조치를 받지 않으면 MRI 또는 을 받는 경우가 많다. 퇴행성 질환(관절염, 인대·움직일 때 행동장애에는 물론이고 잠자리에서도 극 지게 한다.

통증이나, 시큰거림, 저림, 힘 빠짐이 반복적으 야 한다. 보행장애, 행동장애가 오기 전 조기예: 제때에 치료를 받는다면 수술하지 않고 충분히 치

본원에서는 환자의 고통을 내 가족의 고통으로 속효성으로 치료하며 환자 본인과 그 가족의 무 치료의 목적을 두고 있다. 추나요법과 침 약물요 다 환자를 환자로 보지 않고 내 신체의 일부라 생

“그리고 부끄러워서는 “감사합니다.”라고 말하고 싶습니다.”



## 1 자신있는 효소 함량!

HOPE 벌효효소 액티브는 효소를 보충해 우리가 먹은 음식물이 잘 분해되고 영양소가 잘 흡수되도록 도와줍니다. 1포에 아밀라이제와 프로테아제가 각각 4,500(U) 이상씩 들어 있어, 하루 1포로 무 약 3/4개 키위 약 3개 만큼의 효소를 섭취하실 수 있습니다. 이제 HOPE 벌효효소 액티브로 일상의 건강을 챙기세요!

(1포 76 g / 무 400 g 기준 자체실험결과)

© 2010 HOPE 벌효효소 액티브

## 2 활기찬 HOPE 고유의 (Reg) + 습니다. 증기도 벌효효. 충심의

활기찬 HOPE 고유의 (Reg) + 습니다. 증기도 벌효효. 충심의